



PROTOCOLE

COREVIH

Centre Hospitalier Andrée Rosemon
Avenue des flamboyants - B.P. 6006 97300 CAYENNE

Référence :	Recommandations vaccinales pour les patients vivants avec le VIH adultes	
Document organisationnel : Document opérationnel : x	SECTEUR EMETTEUR : COREVIH GUYANE	PAGE : 1/4 Date d'émission : 21/04/2022 Date de révision :
Rédaction : Nom : LUCARELLI Aude Fonction : Médecin COREVIH	Vérification : Nom : WALTER Gaelle Fonction : Médecin UMIT	Approbation : Nom : ABOUD Philippe Fonction : Médecin CRAIG
Ont collaboré à l'écriture : Dr ABOUD, Dr BOUTROU, Dr EL GUEDJ, Dr LE GOFF, Dr MAISONOBE, Dr MICHAUD, NALDJINAN, Dr WALTER		



OBJET

Etablir le calendrier vaccinal lors du suivi d'un patient vivant avec le VIH adulte.

TEXTE DE REFERENCE

Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, Recommandations du groupe d'experts, Rapport 2013 sous la direction du Pr Philippe MORLAT. Mise à jour juillet 2018.
Mes vaccins.net, Le point sur la stratégie de rappel vaccinal chez les personnes ayant eu une primovaccination complète contre la covid 19, octobre 2021.
Recommandations Haute Autorité de Santé Covid-19 Populations éligibles à une dose de rappel de vaccin, aout 2021.
juillet 2018.





PROTOCOLE

COREVIH

Centre Hospitalier Andrée Rosemon

Avenue des flamboyants - B.P. 6006 97300 CAYENNE

VACCINS VIVANTS ATTENUES

BCG	CONTRE INDIQUE
ROUGEOLE OREILLON RUBEOLE	<p align="center">Si CD4 <200/mm³ : CONTRE INDIQUE</p> <p>Sérologie rougeole systématique sur bilan initial</p> <p>Si patients non immuns : 2 doses de vaccin ROR à 1 mois d'intervalle</p> <p>Chez la femme en âge de procréer : sérologie rubéole systématique</p> <p>Si patientes non immuns : report 2 mois projet grossesse</p> <p align="center">Si vaccinée rougeole : 1 dose ROR</p> <p align="center">Si non vaccinée rougeole : 2 dose à 1 mois d'intervalle</p>
VARICELLE	<p align="center">Si CD4 <200/mm³ : CONTRE INDIQUE</p> <p>Sérologie systématique chez patients sans antécédent de varicelle</p> <p>Si non immuns : 2 doses espacées de 6 semaines</p> <p>Chez la femme en âge de procréer reporter la grossesse à 1 mois après 2eme dose</p>
FIEVRE JAUNE	<p align="center">OBLIGATOIRE</p> <p>Si CD4 <200/mm³ : CONTRE INDIQUE</p> <p align="center">→ Rédaction d'un certificat de contre indication</p> <p>Si CD4 > 200/mm³ : Vaccination tous les 10 ans</p> <p>NB : contrôle des Anticorps antiamarile au bilan de découverte</p> <p>Si Anticorps positif (>10 UI/ml) avec date de vaccination inconnue : rappel à 10 ans</p>
ROTA VIRUS	NON RECOMMANDE





PROTOCOLE

COREVIH

Centre Hospitalier Andrée Rosemon

Avenue des flamboyants - B.P. 6006 97300 CAYENNE

VACCINS INACTIVES ET SOUS UNITAIRES

DIPHTERIE TETANOS POLIOMELITE COQUELUCHE ACELULAIRE (dTCaP)	<p>Patient non vacciné :</p> <p>1 dose dTCaP puis rappel à 6 mois par dTP Puis dTCaP tous les 10 ans</p> <p>Patient vacciné dans l'enfance :</p> <p>Rappel à 25 ans puis tous les 10 ans par dTCaP</p>
HEPATITE B	<p>4 doubles doses (40µg) : M0 M1 M2 M6</p> <p>Contrôle annuel des anticorps anti Hbs et si <10mUI/mL = 1 dose de rappel</p> <p>NB Contrôle sérologie VHB au bilan de découverte</p> <p>Hbc isolé → 1 dose pour recherche réponse anamnesticque et si négatif et ADN VHB négatif, schéma à 3 doubles doses</p>
HEPATITE A (NON REMBOURSE)	<p>Recommandée chez les co-infectés VHB, hépatopathie chronique, les HSH et toxicomanes intra veineux</p> <p>NB contrôle de la sérologie VHA au bilan de découverte</p>
PNEUMOCOQUE	<p>1 dose de vaccin conjugué 13-valents puis 1 dose 23-valents minimum 8 semaines plus tard Rappel tous les 5 ans par 1 dose 23-valents</p> <p>Si patient vacciné par dose 23-valents uniquement, 1 injection de vaccin conjugué 13-valents puis rappel à 5 ans par 1 dose de 23-valents</p>
PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (REMBOURSE jusqu'à 24 ans)	<p>vaccin nonavalent : 1 dose M0 M2 M6</p>
GRIPPE SAISONNIERE	<p>Vaccination annuelle</p>
MENINGOCOQUE C	<p>Patients non vaccinés et âge < 25ans : 1 dose de vaccin conjugué monovalent</p>

VACCINATION COVID

Selon recommandations actuelles

Attention recommandations évolutives

On considère patient immunodéprimé <350/mm³

