




Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau

Médicaments antirétroviraux

ASSOCIATIONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES

COMBINAISONS DE 4 MOLÉCULES		DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE		PLANIFICATION DES PRISES		RECOMMANDATION DE PRISE**	
TAF+FTC+ EVG+CBR1	TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE + EMTRICITABINE + ELVITÉGRAVIR + COBICISTAT						
	GENVOYA® GILEAD	1 comprimé (10 mg ténofovir alafénamide + 200 mg emtricitabine + 150 mg elvitégravir + 150 mg cobicistat) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas (400 Kcal)
	COMBINAISONS DE 3 MOLÉCULES						
EFV+FTC+ TDF	EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL						
	ATRIPLA® GILEAD	1 comprimé (600 mg efavirenz + 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre à jeun (1h avant ou 2h après un repas), de préférence le soir au coucher
	Génériques de Atripla® GILEAD	 BIOGARAN	 KRKA	 VIATRIS	 SANDOZ	 TEVA	
BIC+FTC+ TAF	BICTÉGRAVIR + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE						
	BIKTARVY® GILEAD	1 comprimé (50 mg bictégravir + 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir alafénamide) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
DOR+3TC+ TDF	TÉNOFOVIR DISOPROXIL + DORAVIRINE + LAMIVUDINE						
	DELSTRIGO® MSD	1 comprimé (245 mg ténofovir disoproxil + 100 mg doravirine + 300 mg lamivudine) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
RPV+FTC+ TDF	RILPIVIRINE + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL						
	EVIPLERA® GILEAD	1 comprimé (25 mg rilpivirine + 200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
RPV+FTC+ TAF	RILPIVIRINE + EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE						
	ODEFSEY® GILEAD	1 comprimé (25 mg rilpivirine + 200 mg emtricitabine + 25 mg ténofovir alafénamide) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
3TC+ ABC+ DTG	ABACAVIR + LAMIVUDINE + DOLUTÉGRAVIR						
	TRIUMEQ® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg abacavir + 300 mg lamivudine + 50 mg dolutégravir) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	COMBINAISONS DE 2 MOLÉCULES						
3TC+ ZDV	LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE						
	COMBIVIR® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg lamivudine + 300 mg zidovudine) 2 fois/jour				 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Génériques de Combivir® VIIV HEALTHCARE	 ARROW	 VIATRIS	 SANDOZ	 TEVA		
CBG+RPV	CABOTÉGRAVIR + RILPIVIRINE						
	VOCABRIA® VIIV HEALTHCARE + REKAMBYS® JANSSEN	Instauration orale optionnelle : 1 comprimé de cabotégravir (30 mg) pendant 1 mois en association avec, 1 comprimé de rilpivirine (25 mg), 1 fois/jour pendant 1 mois.				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
		Injections d'initiation aux mois 1 et 2 : une injection de 600 mg (3mL) de cabotégravir en association avec une injection de 900 mg (3mL) de rilpivirine.					bien suivre les recommandations
A partir du mois 4, injection tous les 2 mois : une injection de 600 mg (3mL) de cabotégravir en association avec une injection de 900 mg (3mL) de rilpivirine.							
DTG+3TC	DOLUTÉGRAVIR + LAMIVUDINE						
	DOVATO® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (50 mg dolutégravir + 300 mg lamivudine) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
DTG+RPV	DOLUTÉGRAVIR + RILPIVIRINE						
	JULUCA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (50 mg dolutégravir + 25 mg rilpivirine) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
ABC+3TC	ABACAVIR + LAMIVUDINE						
	KIVEXA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg abacavir + 300 mg lamivudine) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Génériques de Kivexa® VIIV HEALTHCARE	 BIOGARAN	 VIATRIS	 SANDOZ	 TEVA	 ZENTIVA	
FTC+TDF	EMTRICITABINE + TÉNOFOVIR DISOPROXIL						
	TRUVADA® GILEAD	1 comprimé (200 mg emtricitabine + 245 mg ténofovir disoproxil) 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre de préférence avec un repas
	Génériques de Truvada® GILEAD	 BIOGARAN	 KRKA	 VIATRIS	 SANDOZ	 TEVA	
INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)							
FTC	EMTRICITABINE						
	EMTRIVA® GILEAD	1 gélule (200 mg), 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
3TC	LAMIVUDINE						
	EPIVIR® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour				 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
		ou 1 comprimé (300 mg), 1 fois/jour				 toutes les 24h	
	Génériques de Epivir® VIIV HEALTHCARE	 VIATRIS 150 mg		 VIATRIS 300 mg			
TDF	TÉNOFOVIR DISOPROXIL						
	VIREAD® GILEAD	1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
	Génériques de Viread® GILEAD	 ARROW	 BIOGARAN	 VIATRIS	 SANDOZ	 TEVA	 ZENTIVA
INHIBITEURS DE LA PROTÉASE (IP)							
DRV	DARUNAVIR						
	PREZISTA® JANSSEN	2 comprimés (400 mg), 1 fois/jour boostés avec 100 mg de Norvir®				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
		ou 1 comprimé (600 mg), 2 fois/jour boosté avec 100 mg de Norvir® à chaque prise				 toutes les 12h	
	Génériques de Prezista® JANSSEN	ou 1 comprimé (800 mg), 1 fois/jour boosté avec 100 mg de Norvir®				 toutes les 24h	
		 KRKA 600 MG	 KRKA 800 MG	 VIATRIS 400 MG	 VIATRIS 600 MG	 VIATRIS 800 MG	
ATV	ATAZANAVIR						
	REYATAZ® BMS	1 gélule (300 mg), 1 fois/jour boostée avec 100 mg de Norvir® (ou 2 gélules à 200 mg en fonction du traitement antirétroviral associé)				 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas
INHIBITEUR DE POST-ATTACHEMENT							
IBA	IBALIZUMAB						
	TROGARZO® THERATECHNOLOGIES <i>Disponible sous conditions</i>	1 dose de charge unique 2000 mg (en perfusion)					bien suivre les recommandations
1 dose d'entretien 800 mg toutes les 2 semaines (en perfusion)							

Des conseils et astuces pour bien prendre son traitement sont disponibles sur l’affiche grand format.

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)						
DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE			PLANIFICATION DES PRISES	RECOMMANDATION DE PRISE **		
RPV	RILPIVIRINE					
	EDURANT® JANSSSEN	1 comprimé (25 mg), 1 fois/jour		 toutes les 24h	à prendre au cours d'un repas (min. 500 Kcal)	
EVR	ETRAVIRINE					
	INTELENCE® JANSSSEN	2 comprimés (100 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h	à prendre au cours d'un repas	
		ou 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h		
DOR	DORAVIRINE					
	PIFELTRO® MSD	1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour		 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	
NVP	NÉVIRAPINE					
	VIRAMUNE® BOEHRINGER INGELHEIM	1 comprimé (200 mg), 1 fois/jour les 14 premiers jours		 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	
		puis 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h		
	Génériques de Viramune® BOEHRINGER INGELHEIM	 ARROW	 VIATRIS	 SANDOZ		 TEVA
NVP	VIRAMUNE LP® BOEHRINGER INGELHEIM	1 comprimé (400 mg), 1 fois/jour en remplacement des comprimés de VIRAMUNE® 200 mg pris 2 fois/jour ou en relais après 14 jours d'une prise unique de VIRAMUNE® 200 mg			 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas
	Générique de Viramune LP® BOEHRINGER INGELHEIM				 SANDOZ toutes les 24h	
INHIBITEUR DE FUSION						
T-20	ENFUVRTIDE					
	FUZÉON® ROCHE	1 injection sous-cutanée de 90 mg (1mL) 2 fois/jour toutes les 12h			bien suivre les recommandations de reconstitution du produit et d'injection	
INHIBITEURS DE L'INTEGRASE						
RAL	RALTÉGRAVIR					
	ISENTRESS® MSD	1 comprimé (400 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	
RAL	ISENTRESS® MSD	2 comprimés (600 mg), 1 fois/jour		 toutes les 24h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	
DTG	DOLUTÉGRAVIR					
	TIVICAY® VIIV HEALTHCARE	SELON LE PROFIL VIRAL	1 comprimé (50 mg), 1 fois/jour	 toutes les 24h	à prendre en dehors ou au cours des repas	
			1 comprimé (50 mg), 2 fois/jour **	 toutes les 12h	à prendre de préférence au cours d'un repas	
BOOSTER						
RTV	RITONAVIR					
	NORVIR® ABBVIE	utilisé comme booster de chaque prise d'inhibiteur de protéase, c'est-à-dire pour augmenter la concentration des molécules prises en association			 Posologie en fonction de l'antiprotéase associé.	à prendre au cours d'un repas
	Générique de Norvir® VIATRIS					
INHIBITEUR DU RECEPTEUR CCR-5						
MVC	MARAVIROC					
	CELSENTRI® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	
		ou 1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour		 toutes les 12h		
		ou 2 comprimés (300 mg), 2 fois/jour en fonction des antiviraux associés		 toutes les 12h		
INHIBITEUR D'ATTACHEMENT						
FTR	FOSTEMSAVIR					
	RUKOBIA® VIIV HEALTHCARE	1 comprimé (600 mg) 2 fois/jour		 toutes les 12h	à prendre au cours ou en dehors d'un repas	

** Les recommandations de prise sont extraites des RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) publiés par l'ANSM lors de la mise sur le marché des médicaments. Cependant, pour certaines molécules et selon votre profil, il peut parfois être préférable de prendre son traitement en mangeant pour faciliter son absorption. Il est donc conseillé d'en parler avec son médecin ou pharmacien.

Évaluer nos outils



Commandez nos outils pratiques
www.actions-traitements.org

Ligne d'écoute
01 43 67 00 00
lundi au jeudi de 15h à 18h
ou par mail 7j/7 :
ecoute@actions-traitements.org



Toutes les infos sur vos traitements dans nos Infocartes.



Disponible en grand format sur notre site internet.



Vous prenez d'autres médicaments que des ARV /AAD ?
Vérifiez leur compatibilité avec votre traitement grâce à notre Règlette.

Médicaments antirétroviraux
Tableau récapitulatif

Édition Version 2022

FORMES ADULTES
DISPONIBLES EN FRANCE



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org

[f /actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@actionstraitements](https://www.instagram.com/actionstraitements) [@Association_AT](https://www.linkedin.com/company/actions-traitements)
[Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...)